

ACTIVE

Nombre Comercial	:	ACTIVE
Grupo	:	Fertilizante Foliar
Tipo	:	Bioelicitador de Defensas Naturales
Grado	:	Agrícola
Formulado por	:	Master Agro Business SAC.
Comercializado por	:	Master Agro Business SAC.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

Fosfito de Potasio	84.00 %
P2O5 Soluble en agua	49.00 %
K2O5 Soluble en agua	35.00 %
Vitamina B1	0.10 %

Formulación	:	Concentrado Soluble SL
Modo de acción	:	Absorción Foliar
Densidad (a 20°C)	:	1,15 g/ml

CARACTERÍSTICAS

ACTIVE es un fertilizante foliar con un elevado contenido de fosfito potásico que debido a su bajo peso molecular y solubilidad es fácilmente adsorbido por vía foliar y radicular (ascendente y descendente).

ACTIVE es un inductor y potencializador de las fitoalexinas las cuales provienen y controlan enfermedades del tipo fungosas y/o bacterias.

ACTIVE al ser aplicado en las primeras etapas de desarrollo de los cultivos favorece la formación de las raíces, estimula la floración, favorece el desarrollo de frutos (calidad, color, brix) y potencia el sistema inmunológico de las plantas favoreciendo la formación de fitoalexinas las cuales protegen a las plantas de los ataques de bacterias y hongos, en especial de Oomycetos (Phytophthora, Pythium, Bremia, Pseudoperonospora, Plasmopara), entre otros.

ACTIVE puede ser aplicado por vía foliar, en drench, fertirriego y de manera tópica en el tronco en el cual se transporta por el xilema y floema.

ACTIVE

RECOMENDACIONES DE USO EN FRUTALES

CULTIVO	ENFERMEDAD	DISIS/CIL	DOSIS/HA	MOMENTO DE APLICACION
Esparrago.	Pudrición de corona.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación después del brotamiento (cambio de color de los filocladios). Repetir las aplicaciones cada 15 días.
Leguminosas: Pallar, Frijol, Arveja, Vainita, Garbanzo, Habas, Holantao, Cauqui.	Chupadera, Pudrición.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación cuando la planta presente 4 foliolos. Repetir 2 veces cada 15 días.
Ajo, Cebolla, Poro, Nabo, Betarraga, Zanahoria.	Mancha Foliar, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación a la tercera hoja ó 7 días después del trasplante, repetir 2 veces cada 10 días.
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas.	Mancha Foliar, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación a la tercera hoja ó 7 días después del trasplante, repetir 2 veces cada 10 días.
Alcachofa, Tomate, Pimiento, Páprika, Rocoto, Aji, Zapallo, Melón, Sandía, Pepino, Fresa.	Chupadera, Mancha Foliar.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación 5 días después del trasplante. Repetir 3 veces cada 15 a 20 días.
Papa, Camote, Yuca.	Pudrición Radicular, Mancha.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación 20 días después de la siembra ó cuando se realiza el aporque.
Café, Cacao	Pudrición Radicular, Mancha Foliar.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación 10 días después del trasplante. Repetir 3 veces cada 15 a 20 días.
Algodón.	Chupadera, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	Aplicar después del desahije y repetir a los 15 días.
Arroz.	Mancha Foliar.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	En almacigo aplicar 3 días antes de la saca. Después aplicar en la etapa de macollamiento y punto de algodón.
Frutales, Caducifolios: Manzana, Pera, Ciruelo, Melocotón y demás frutales.	Muerte Regresiva, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación al inicio de floración. 2da. aplicación después del cuajado. 3ra. aplicación al inicio del crecimiento del fruto.
Frutales siempre verdes: Cítricos, Mango, Olivo, Papayo, Café, Cacao, Lúcumá, Granadilla y demás frutales.	Muerte Regresiva, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación en post cosecha. 2da. aplicación después del cuajado. 3ra. aplicación al inicio del crecimiento del fruto. Plantas con inicio de marchitez aplicar dirigido a la raíz 30 - 50 cc. por árbol diluido en 10 litros de agua.
Vid.	Agalla de la Corona, Muerte Regresiva.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación al inicio de floración. Repetir 3 veces en crecimiento de bayas.
Banano.	Mancha Foliar, Pudrición de Tallo.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación antes de la floración. 2da. aplicación del crecimiento del fruto.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicaciones múltiples de **ACTIVE** son más efectivas que una sola aplicación. Esto permite mantener una alta concentración de ión fosfito en los tejidos vegetales, estimulando la síntesis de fitoalexinas.

Aplicaciones al suelo de **ACTIVE** según recomendaciones del asesor técnico.

Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje del cultivo, en el caso de ataques severos o condiciones extremas, usar las dosis máximas o repetir las aplicaciones a intervalos más cortos.

ACTIVE es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto con productos cálcicos, aceites y cobres.

ACTIVE

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan de nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido.

El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envases : 1 L - 5 L - 20 L - 200 L

RESOLUCIÓN SENASA

Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

