



K-RAJO

TRASLOCADOR DE AZUCARES **300**

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

Hidróxido de Potasio (KOH) soluble en agua.....	30.00 %
Boro.....	1.00 %
Molibdeno.....	0.50 %
Quelatos organicos.....	39.00 %
Vit. B1.....	0.1 %



ESTIMULADOR DEL METABOLISMO CELULAR Y LA MOVILIZACIÓN DE AZUCARES

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MASTER AGRO BUSINESS SAC
 RUC: 20600918452
 JR GENERAL MANUEL VELARDE 119 URB CERCADO SURQUILLO - LIMA
 PERÚ
 T+51-1 7912280



RESOLUCIÓN SENASA

Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA
 Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA
 Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA
 Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

www.masteragro.mx

CONTENIDO NETO: LITROS



FOLIAR TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS:

K - RAJO 300 es un fertilizante líquido con un elevado contenido de Potasio, este elemento está ligado totalmente a una molécula orgánica (ácido acético) y es por lo tanto totalmente asimilable por la planta.
K - RAJO300 contiene vitamina B1 que es un cofactor enzimático que activa las enzimas dormantes (apoenzimas) que promueven una mejora de todos los procesos fisiológicos internos de la planta.
 La vitamina B1 activa también el crecimiento y la renovación del sistema radicular, lo que permite un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes del suelo, mejorando el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
K - RAJO 300 incrementa la traslocación de los sólidos solubles en el floema, por lo que acelera el crecimiento y desarrollo de los frutos, tubérculos, bulbos y cualquier otro órgano de reserva cosechable.
 Incrementa el tamaño, peso, color, brix, sabor, aroma y brillo aumentando la calidad del órgano cosechable.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	ETAPA FENOLOGICA DE APLICACIÓN
Vid.	Para incrementar el peso, color y tamaño de bayas: ° Aplicar al inicio de enero. ° Repetir la aplicación 3 veces cada 15 días en pleno desarrollo de bayas.
Espárrago.	Para incrementar el calibre de turiones: ° 20 días antes del último riego para el chapodo, repetir dos aplicaciones.
Cítricos, Melocotón, Mango, Palto, Pécano, Higo, Pera, Manzana, Olivo, Café, Banano, Granadilla.	Para incrementar la firmeza y crecimiento de frutos: ° En crecimiento y desarrollo de frutos, repetir 2 a 3 veces cada 15 días.
Papa, Tomate, Páprika, Pimientos y Ajes.	Mayor tamaño, color y peso de frutos y tubérculos: °Durante el desarrollo de frutos y tubérculos hasta 20 días antes de la cosecha.
Cebolla, Ajo, Poro.	Para mayor tolerancia a enfermedades y obtener frutos grandes y uniformes: ° A 10 días después del trasplante. ° Al inicio de bulbeo. ° En pleno desarrollo del bulbo.
Piña.	Para incrementar tamaño y peso: ° En frutos jóvenes. ° En pleno desarrollo de frutos. ° A los 30 días de la cosecha.
Arroz.	Favorece e incrementa el llenado uniforme de los granos para mayor peso ° Llenado de granos. ° Entre la 2da. y 3ra. semana antes de la cosecha.:
Alcachofa y otras Hortalizas.	Para incrementar la traslocación de los almidones y fotosintatos: ° Al inicio de cosecha, repetir cada 7 a 10 días.
Algodón.	Al desarrollo de bellotas, repetir de 2 a 3 aplicaciones.
Pallar, Garbanzo, Arveja, Holantao, Frijol, Vainita.	Al inicio de llenado de granos 2 a 3 aplicaciones.
Arándanos, Granados.	De 2 a 3 aplicaciones durante la cosecha

DOSIS

De 1 a 2 Litros en 200 litros de agua

En etapas finales de formación de frutos, tubérculos, bulbos y otros órganos cosechables se puede elevar la dosis de 2 a 4 litros/200 litros de agua, para acelerar la traslocación,

COMPATIBILIDAD

Evitar mezclas con compuestos con fuerte reacción alcalina, aceites, azufre, polisulfuros y compuestos cúpricos.

PRECAUCIONES

A pesar de su baja toxicidad es conveniente tomar en cuenta todas las precauciones debidas. Almacenar el producto en lugar ventilado fresco y seco fuera del alcance de los niños y animales.

GARANTIA

MASTER AGRO garantiza que la composición, formulación y contenido de este producto corresponden a las indicaciones en la etiqueta, siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS