Rízoma

ACTIVADOR METABOLICO

CONTENIDO NETO:

1 Kg

CARACTERÍSTICAS

El ácido glutámico es un aminoácido que participa en diversos procesos metabólicos en la planta. Es un metabolito fundamental en la síntesis de la clorofila y la formación de tejido vegetal. Eleva la concentración de clorofila en las plantas que a su vez aumenta la absorción de energía luminosa, la cual conduce a un mayor rendimiento de la fotosíntesis. Es un precursor de **GABA**.

El **GABA** un potente bioestimulante en plantas que regula el balance hídrico, mejora la fotosíntesis y aumenta la resistencia a factores de estrés ambiental. Actúa como una molécula señal, induce respuestas rápidas en el metabolismo vegetal.

Rizoma es un agente quelatante muy efectivo, es esencial para la polinización, además aumenta la germinación del polen. Actúa como agente osmótico para el citoplasma protector de las células, favorece la apertura de las estomas, a través de la trasnominación, favorece al resto de los aminoácidos.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS	APLICACIÓN	
Frutales en general	800gr/ha.	Sistema de Riego.	Aplicar después del brotamiento y repetir en etapas fenologicas críticas del desarrollo del cultivo (floración, amarre y desarrollo del fruto).
	400 g/ha.	Aplicación Foliar.	
Solanaceas, leguminosas y cucurbitaceas	400 g/ha.	Sistema de Riego.	Aplicar a los 15 días del transplante y repetir al inicio de la floración y después de cada corte.
	150-200 g/Cil de 200 L.	Aplicación Foliar.	
Liliaceas	400 g.	Sistema de Riego.	Aplicar a los 15 días del transplante y/o siembra; repetir al inicio de la formación del bulbo.
	150-200g/Cil de 200 L.	Aplicación Foliar.	
Gramineas	200 g.	Aplicación Foliar.	Aplicar a la formación de la sexta o novena hoja y repetir cada 15 días hasta el inicio de la formación del bulbo. Aplicar al inicio de la formación del bulbo y repetir a los 5 días.
Hortalizas	400 g.	Sistema de Riego.	Aplicar a la formación del tercer o cuarto entrenudo.
	200 g.	Aplicación Foliar.	
Estrés por bajas temperaturas.	400 g.	Sistema de Riego.	Aplicar cada 15 días en periodos de bajas temperaturas.
	250 g.	Aplicación Foliar.	
Estrés por falta de agua y altas temperaturas.	500 g.	Sistema de Riego.	Aplicar en periodos críticos de altas temperaturas y de falta de humedad.
	300 g.	Aplicación Foliar.	

LOTE: LEX 24091000
F: NOVIEMBRE 2024
V: NOVIMBRE 2027

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONA, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS