ACTIVE

Linea ELICITORES

FOSFITO DE POTASIO 84.00%

FITOALEXINAS

COMPOSICION QUIMICA (P/V)

Fosfito de potasio .....84.00 %
Equivalente a 566 g/l de ácido fosforoso
Riqueza:
P2O5 Soluble en agua: ..... 49.00 %
K2O5 Soluble en agua: ..... 35.00 %
Vit. B1: ..... 0.10 %

EFICACIA CALIDAD PROBADA

Master Agro
Agro & Vida

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
MASTER AGRO BUSINESS SAC
RUC: 20600918452
JR. JOSE MANUEL ITURREGUI 119 URB CERCADO
SURQUILLO - LIMA
PERÚ
T+51-1 7570327

RESOLUCIÓN SENASA
Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA
Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA
Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA
Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

www.masteragro.mx

RECYCLE

CONTENIDO NETO: LITROS



MODO DE APLICACION

CULTIVO	ENFERMEDAD	DISIS/CIL	DOSIS/HA	MOMENTO DE APLICACION
Esparrago.	Pudrición de corona.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación después del brotamiento (cambio de color de los filoclados). Repetir las aplicaciones cada 15 días.
Leguminosas: Pallar, Frijol, Arveja, Vainita, Garbanzo, Habas, Holantao, Caupi.	Chupadera, Pudrición.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación cuando la planta presente 4 foliolos. Repetir 2 veces cada 15 días.
Ajo, Cebolla, Poro, Nabo, Betarraga, Zanahoria.	Mancha Foliar, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación a la tercera hoja ó 7 días después del transplante, repetir 2 veces cada 10 días.
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas.	Mancha Foliar, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación a la tercera hoja ó 7 días después del transplante, repetir 2 veces cada 10 días.
Alcachofa, Tomate, Pimiento, Páprika, Rocoto, Ají, Zapallo, Melón, Sandia, Pepino, Fresa.	Chupadera, Mancha Foliar.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación 5 días después del transplante. Repetir 3 veces cada 15 a 20 días.
Papa, Camote, Yuca.	Pudrición Radicular, Rancha.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación 20 días después de la siembra ó cuando se realiza el aporque.
Café, Cacao	Pudrición Radicular, Mancha Foliar.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	1ra. aplicación 10 días después del transplante. Repetir 3 veces cada 15 a 20 días.
Algodón.	Chupadera, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	Aplicar después del desahíje y repetir a los 15 días.
Arroz.	Mancha Foliar.	0.5 - 1 L.	2 - 4 L.	En almacigo aplicar 3 días antes de la saca. Después aplicar en la etapa de macollamiento y punto de algodón.
Frutales, Caducifolios: Manzana, Pera, Ciruelo, Melocotón y demás frutales.	Muerte Regresiva, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación al inicio de floración. 2da. aplicación después del cuajado. 3ra. aplicación al inicio del crecimiento del fruto.
Frutales siempre verdes: Cítricos, Mango, Olivo, Papayo, Café, Caco, Lúcuma, Granadilla y demás frutales.	Muerte Regresiva, Pudrición Radicular.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación en post cosecha. 2da. aplicación después del cuajado. 3ra. aplicación al inicio del crecimiento del fruto. Plantas con inicio de marchitez aplicar dirigido a la raiz 30 - 50 cc. por árbol diluido en 10 litros de agua.
Vid.	Agalla de la Corona, Muerte Regresiva.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación al inicio de floración. Repetir 3 veces en crecimiento de bayas.
Banano.	Mancha Foliar, Pudrición de Tallo.	0.5 - 1 L.	4 - 6 L.	1ra. aplicación antes de la floración. 2da. aplicación del crecimiento del fruto.

CARACTERISTICAS

ACTIVE es un fertilizante foliar con un elevado contenido de fosfito potásico que debido a su bajo peso molecular y solubilidad es fácilmente adsorbido por vía foliar y radicular (ascendente y descendente).
ACTIVE es un inductor y potencializador de las fitoalexinas las cuales previenen y controlan enfermedades del tipo fungosas y/o bacterianas.
ACTIVE aplicado en las primeras etapas de desarrollo de los cultivos favorece la formación de las raíces, estimula la floración favorece el desarrollo de frutos(calidad, color, brix) y potencia el sistema inmunológico de las plantas, favoreciendo la formación de fitoalexinas, las cuales protegen a las plantas de los ataques de bacterias y hongos, en especial de Oomycetos (Phytophthora, Pythium, Bremia, Pseudoperonospora, Plasmopara), entre otros.
ACTIVE puede ser aplicado por vía foliar, en drench, fertirriego y de manera tópica en el tronco se transporta por el xilema y floema

PRECAUCIONES

° Lea cuidadosamente la etiqueta de **ACTIVE** antes de usar el producto.
° No almacenarlo ni transportarlo junto a productos alimenticios, bebidas, alimentos para animales, ni medicinas.
° No comer, fumar o beber durante su aplicación.
° Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
° Después de aplicar y manipular el producto, lavarse bien las manos y cara con abundante agua y jabón.
° No contaminar las fuentes de agua con el producto o sobrantes.

DOSIS:

Foliar: 0.5 a 1 L./Cil. de 200 L Radicular: 2 a 6 L./Ha.
Tópica al tronco frutales: Pintar las zonas afectadas con una solución de 400 cc/l de agua. Repetir 3 a 4 veces al año.

"AGITESE ANTES DE USAR"

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS