

FOLTEC PHOS

MEJORADOR DE LA FLORACION Y EL CUAJADO

450 Zn

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

Fósforo (P2O5)	32.00 %
Nitrógeno	8.00 %
Zinc (Zn)	1.50 %
Boro (B)	0.50 %
Extracto de Algas Marinas	5.00 %
Vitamina B1	0.50 %



FERTILIZANTE FOSFORADO ESTIMULANTE DEL METABOLISMO CELULAR

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MASTER AGRO BUSINESS SAC

RUC: 20600918452

JR JOSE MANUEL ITURREGUI 119 URB CERCADO

SURQUILLO - LIMA

PERÚ

T+51-1 7570327

RESOLUCIÓN SENASA

Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

www.masteragro.mx

CONTENIDO NETO: LITROS



FOLIAR TECHNOLOGY

100 % SOLUBLE



CONTIENE
Zn + Vit. B1

P

Zn

B



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FOLTEC PHOS, es un fertilizante líquido de uso general, con un alto contenido de Fósforo y Zinc bioasimilables por la planta.

FOLTEC PHOS, contiene Tiamina (Vit. B1), extracto de algas marinas que promueven y mejoran los procesos fisiológicos internos de la planta.

La Tiamina (Vit. B1) activa también el crecimiento y/o renovación del sistema radicular lo que permite un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes disponibles en el suelo, mejorando el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS/ CIL
Brócoli, col, coliflor, apio, lechuga, espinaca, ajo, cebolla, poro, nabo, papa, camote, yuca, espárrago, alcachofa, arroz, maíz, algodón, tomate, pimiento, páprika, piquillo, jalapeño, zapallo, melón, pepino, fresa, arveja, pallar, habas, garbanzo, frijo, vainita, holantao.	1era. aplicación después del trasplante o cuando la planta presente de 4 a 6 hojas verdaderas. Intervalo de aplicación cada 20 o 30 días hasta el periodo de pre-floración.	1 - 2 L.
Frutales: Mandarina, naranjo, limón, palto, mango, papayo, café, cacao, lúcuma, maracuyá, olivo, granadilla, granado, pecano, vid, durazno, peral, higo y demás frutales.	Intervalo de aplicación de 10 a 15 días durante el periodo de floración.	1 - 2 L.
Planta ornamentales y flores. Plantas forestales	Aplicación cada 20 días hasta la cosecha.	1 - 2 L.

PRECAUCIONES DE USO

A pesar de ser un producto no tóxico, se deberá tener las precauciones de seguridad comunes a todos los plaguicidas y sustancias afines, esto es importante debido a que **FOLTEC PHOS** se usa muchas veces en mezcla con plaguicidas agrícolas.

AGITAR ANTES DE USAR



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS