

FOSFITO DE ZINC 45.00 %

FITOALEXINAS

COMPOSICION QUIMICA (P/V)

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua.....	34 %
Zinc (Zn) soluble en agua.....	11 %
Vit. B1.....	0.01 %



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MASTER AGRO BUSINESS SAC

RUC: 20600918452

JR. JOSE MANUEL ITURREGUI 119 URB CERCADO

SURQUILLO - LIMA

PERÚ

T+51-1 7570327

RESOLUCIÓN SENASA

Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

www.masteragro.mx

CONTENIDO NETO: LITROS

MODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	ENFERMEDAD	MOMENTO DE APLICACIÓN
Espárrago	Fusarium	1era. Aplicación después del brotamiento (cambio de color de los filocliados). Repetir las aplicaciones cada 15 días.
Leguminosas: Pallar, frijol, arvejas, vainita, garbanzo, habas, holantau, caupi.	Rhizoctonia Fusarium	1era. Aplicación cuando la planta presente cuatro folíolos. Repetir 2 veces cada 15 días.
Ajo, cebolla, poro, nabo, betarraga, zanahoria	Mildió	1era. Aplicación a partir de la tercera hoja o siete días después del trasplante. repetir 2 veces cada 10 días.
Brócoli, col, coliflor, col de bruselas.	Mildió	1era. Aplicación a partir de la tercera hoja o siete días después del trasplante. repetir 2 veces cada 10 días
Alcachofa, tomate, pimiento, páprika, rocoto, ají, zapallo, melón, sandía, pepino, fresa.	Phytlum Phytophthora Mildió Alternaria	1era. Aplicación cinco días después del trasplante. Repetir tres veces cada 10 a 15 días.
Papa, camote, yuca	Phytophthora Fusarium	1era. Aplicación 20 días después de la siembra de los esquejes o cuando se expanda totalmente el brote.
Algodón	Wilt Rhizoctonia	Aplicar después del desahije luego repetir a los 15 días
Arroz	Piricularia	En almáximo aplicar 3 días antes de la saca. Después aplicar en la etapa de macollamiento y punto de algodoné.
Claveles y flores ornamentales, gladiolos, gypsophilas, rosas.	Fusarium Alternaria	1era. Aplicación cinco días después del trasplante. Repetir 3 veces cada 10 a 15 días.
Vid	Plasmopora vitis	1era. Aplicación al inicio de floración. 2da. Aplicación al cuajado de frutos.
Frutales caducifolios: Manzana, pera, ciruelo, arandano, melocotón y demás frutales	Lasiodiplodia Mildió	1era. Aplicación al inicio de floración. 2da. Aplicación después del cuajado. 3ra. Aplicación al inicio del crecimiento del fruto.
Cítricos, mango, olivo, papayo, café, cacao, lucuma, granadilla, granado y demás frutales.	Phytophthora Lasiodiplodia	1era. Aplicación en Post cosecha. 2da. Aplicación después del cuajado. 3era. Aplicación al inicio del crecimiento del fruto. Plantas con inicio de marchitez aplicar PHYLEX de 30 a 50 cc. dirigido a la raíz en una solución de 10 litros de agua por árbol.

DOSIS GENERAL: Foliar: De 500 a 750 CC./ Cilindro de 200 Litros; Radicular: De 2 a 4 Litros por Hectárea.

CARACTERÍSTICAS

PHYLEX, fórmula que contiene Fosfito de Zinc, es caracterizado por una total solubilidad en agua y una fuerte actividad sistémica en el tejido vegetal.

En el interior de las plantas desarrolla además de las funciones nutricionales, una destacada acción protectora, derivada del aumento de las síntesis de fitoalexinas endógenas sustancias naturales que potencian la resistencia de la planta respecto a agentes patógenos como hongos y bacterias.

PHYLEX consigue aumentar la masa radicular de manera sustancial, promueve una mejor calidad de floración, cuajado y desarrollo de frutos mejorando con esto la calidad de la producción.

PRECAUCIONES

- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, bebidas, alimentos para animales y medicinas.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Después de aplicar y manipular el producto lavarse bien las manos y la cara con abundante agua y jabón.
- No contaminar las fuentes de agua con el producto o sobrantes de la aplicación.



**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO**

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS