



Rízoma

ACTIVADOR METABOLICO

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

Ácido Glutámico	75.00 %
Vit. B1	0.50 %



**Master
Agro**
Agro & Vida



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MASTER AGRO BUSINESS SAC

RUC: 20600918452

JR. JOSE MANUEL ITURREGUI 119 URB CERCADO

SURQUILLO - LIMA

PERÚ

T+51-1 7570327

RESOLUCIÓN SENASA

Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA

Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

www.masteragro.mx

CONTENIDO NETO:

1 Kg

Linea 
EXPRESS

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO**

CARACTERÍSTICAS

El ácido glutámico es un aminoácido que participa en diversos procesos metabólicos en la planta. Es un metabolito fundamental en la síntesis de la clorofila y la formación de tejido vegetal. Eleva la concentración de clorofila en las plantas que a su vez aumenta la absorción de energía luminosa, la cual conduce a un mayor rendimiento de la fotosíntesis. Es un precursor de **GABA**.

El **GABA** un potente bioestimulante en plantas que regula el balance hídrico, mejora la fotosíntesis y aumenta la resistencia a factores de estrés ambiental. Actúa como una molécula señal, induce respuestas rápidas en el metabolismo vegetal.

Rizoma es un agente quelatante muy efectivo, es esencial para la polinización, además aumenta la germinación del polen. Actúa como agente osmótico para el citoplasma protector de las células, favorece la apertura de las estomas, a través de la trasnominación, favorece al resto de los aminoácidos.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS	APLICACIÓN	
Frutales siempre verde: Palto, Cítricos, Fresa, Frambuesa, Melón, Maracuyá, Granadilla, Papayo, Olivo, Chirimoya, Babano, Café, Piña. Frutales caducifolios: Vid, Arándano, Pecano, Manzano, Durazno, Pera, Granado, Cereza.	1,500gr/ha.	Sistema de Riego.	De 2 a 4 aplicaciones: 1.- En cuajado. 2.- De 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo de frutos.
	500 g/ha.	Aplicación Foliar.	
Solanaceas, leguminosas y cucurbitaceas.	1,000 g/ha.	Sistema de Riego.	Aplicar a los 15 días del trasplante y repetir al inicio de la floración y después de cada corte.
	200-400 g/Cil de 200 L.	Aplicación Foliar.	
Cebolla, Ajo, Poro.	1,000 g.	Sistema de Riego.	Aplicar a los 15 días del trasplante y/o siembra; repetir al inicio de la formación del bulbo.
	200-400g/Cil de 200 L.	Aplicación Foliar.	
Gramíneas	400 g.	Aplicación Foliar.	Aplicar a la formación de la sexta o novena hoja y repetir cada 15 días.
Hortalizas	1,000 g.	Sistema de Riego.	Aplicar a la formación del tercer o cuarto entrenudo.
	400 g.	Aplicación Foliar.	
Estrés por bajas temperaturas.	2,000 g.	Sistema de Riego.	Aplicar cada 15 días en periodos de bajas temperaturas.
	500 g.	Aplicación Foliar.	
Estrés por falta de agua y altas temperaturas.	2,000 g.	Sistema de Riego.	Aplicar en periodos críticos de altas temperaturas y de falta de humedad.
	500 g.	Aplicación Foliar.	



MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS